

Kullanma talimatı: Kullanıcı için bilgiler

Prospan® öksürük pastilleri

Oral sıvı

Etkin madde: Kurutulmuş heder helix folium ekstresi

Bu kullanma talimatının tamamını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. Bu ilaç reçetesiz temin edilebilir. En iyi tedavi sonucunu elde etmek için Prospan® öksürük pastilleri doğru şekilde uygulanmalıdır.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Belirtilerinizin kötüleşmesi veya 7 gün sonra bir iyileşme görülmesi halinde mutlaka bir doktora başvurmalsınız.
- Yukarıda belirtilen yan etkilerden biri sizi önemli derecede etkilerse veya kullanma talimatında listelenmeyen yan etkileri de
- fark ederseniz doktorunuza ya da eczacınıza bilgilendiriniz.

Kullanma talimatının içeriği:

- Prospan® öksürük pastilleri nedir ve ne için kullanılır?
- Prospan® öksürük pastilleri kullanmadan önce nelere dikkat edilmelidir?
- Prospan® öksürük pastilleri nasıl alınır?
- Olası yan etkiler nelerdir?
- Prospan® öksürük pastilleri nasıl saklanır?
- Diğer bilgiler

1. Prospan® öksürük pastilleri nedir ve ne için kullanılır?

Prospan® öksürük pastilleri, solunum yollarının kataral hastalıkları için bitkisel bir ilaçtır.

Prospan® öksürük pastilleri, öksürüğün eşlik ettiği akut solunum yolu enflamasyonu ve kronik enflamatuvar bronşiyal hastalıkların semptomatik tedavisine yardımcı olarak kullanılır.

2. Prospan® öksürük pastillerini kullanmadan önce nelere dikkat edilmelidir?

Prospan® öksürük pastilleri aşağıdaki durumlarda alınmaz

- Etkin maddeye veya ilacın diğer bileşenlerine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.

Prospan® öksürük pastilleri aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanılmalıdır

Şikayetlerin devam etmesi ya da nefes darlığı, ateş, cerahatli ya da kanlı balgam görülmesi durumunda derhal bir doktora danışılmalıdır.

Çocuklar:

Prospan® öksürük pastilleri 6 yaş altı çocuklar için öngörülmemiştir.

Prospan® öksürük pastillerinin diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:

Herhangi bir inceleme yapılmamıştır. Şimdiye kadar hiçbir etki-leşim bilinmemektedir.

Reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilaç kullanıyorsanız ya da

kısa bir süre önce kullandıysanız doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz.

Gebelik ve emzirme dönemi:

Yeterli incelemeler yapılmadığı için bu ilaç gebelikte ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler:

Özel önlemler gerekli değildir.

Prospan® öksürük pastillerinin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler:

Bu ilaç sorbitol ve maltitol içerir. Belli şekerlere karşı toleranssızlık şikayetiniz olduğunu biliyorsanız lütfen Prospan® öksürük pastillerini almadan önce doktorunuza danışınız.

3. Prospan® öksürük pastilleri nasıl alınır?

Prospan® öksürük pastillerini her zaman bu kullanma talimatına göre alınız. Tam emin olmadığınızda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Doktor tarafından aksi belirtilmediği müddetçe normal doz:

Yetişkinler ve 12 yaş ve üstü çocuklarda ihtiyaca göre günde en fazla 4 defa 1 pastil (günde 104 mg kurutulmuş heder helix folium ekstresi veya 624 mg ilaca eşittir).

6-12 yaş arası çocuklarda ihtiyaca göre günde en fazla 2 defa 1 pastil (günde 52 mg kurutulmuş heder helix folium ekstresi veya 312 mg ilaca eşittir).

Uygulama şekli:

Emme yoluyla oral kullanım içindir.

Pastilleri her öğünden sonra (yatarak değil) ağzınızda emerek eritin.

Uygulama süresi:

Tedavinin süresi, klinik tablonun tipine ve şiddetine göre değişir; genellikle 1 hafta sürdürülmelidir. Şikayetleri 1 haftadan uzun sürmesi halinde tıbbi yardım alınmalıdır.

Prospan® öksürük pastillerinin etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna kanaat getirirseniz doktorunuza veya eczacınıza görüşünüz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Prospan® öksürük pastilleri kullandıysanız:

Prospan® öksürük pastilleri günlük olarak dozaj talimatında belirtilen veya doktor tarafından reçete edilenden daha fazla alınmamalıdır. Aşırı miktarda (günlük dozun üç katından fazla) kullanıldığında mide bulantısı, kusma ve ishale neden olabilir. Bu durumda doktorunuza danışmalısınız.

Prospan® öksürük pastillerini kullanmayı unutursanız:

Bir sonraki seferde çift doz almayınız, doktor tarafından reçete edildiği veya kullanma talimatında tarif edildiği şekilde kullanmaya devam edin.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Prospan® öksürük pastillerinin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin değerlendirilmesinde şu yaygınlık bilgileri temel alınmaktadır:

Çok yaygın:	10 kişiden 1'ini etkileyebilen
Yaygın:	100 kişiden 1 ila 10'unu etkileyebilen
Yaygın olmayan:	1.000 kişiden 1 ila 10'unu etkileyebilen
Seyrek:	10.000 kişiden 1 ila 10'unu etkileyebilen
Çok seyrek:	10.000 kişiden 1'inden azını etkileyebilen
Bilinmiyor:	Mevcut verilerle yaygınlığı tahmin edilemiyor

Olası yan etkiler:

Sarmaşık içeren ilaçlar alındıktan sonra nadiren nefes darlığı, şişme, cilt ve mukoza kızarıklıkları, kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir.

Hassas kişilerde bazen mide bulantısı, kusma, ishal gibi mide bağırsak şikayetleri görülebilir. Aşırı duyarlılık reaksiyonunun ilk belirtisinde Prospan® öksürük pastilleri tekrar alınmamalıdır.

Yukarıda belirtilen yan etkilerden biri sizi önemli derecede etkilerse veya kullanma talimatında listelenmeyen yan etkileri de fark ederseniz doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

5. Prospan® öksürük pastilleri nasıl saklanır?**İlacı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız!**

25°C üzerinde sıcaklıkta saklamayınız.

İçeriği neme karşı korumak için orijinal ambalajı içerisinde muhafaza ediniz!

İlacı kutusu ve blister üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmamalısınız! Son kullanma tarihi ayın son gününe denk gelir.

6. Diğer bilgiler**Prospan® öksürük pastilleri neler içerir?**

Etkin maddesi: Kurutulmuş hedera helix folium ekstresi

1 pastil 26 mg kurutulmuş hedera helix folium ekstresi içerir (5 – 7,5 : 1). Özütleyici: Etanol %30 (m/m).

Yardımcı maddeler şunlardır:

Maltitol çözeltisi, sorbitol çözeltisi %70 (kristalize değil) (Ph.Eur.), Arap sakızı, sitrik asit, asesülfam potasyum, orta zincirli trigliseritler, portakal aroması, mentol aroması, arıtılmış su.

1 pastil 0,53 g maltitol ve 0,53 g sorbitol içerir, eşittir yakl. 0,09 BE.

1 pastil 2,6 kcal içerir = 10,6 kJ.

Prospan® öksürük pastillerinin görünümü ve paket içeriği:

Prospan® öksürük pastilleri, 20 (N 1) pastil içeren orijinal paketlerde mevcuttur.

Ruhsat sahibi ve üretici:

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden

Tel.: 06101 / 539 – 300

Faks: 06101 / 539 – 315

İnternet: <http://www.engelhard-am.de>

E-posta: info@engelhard-am.de

Bu kullanma talimatı Ekim 2018 tarihinde onaylanmıştır.

Notlar:

Prospan® öksürük pastilleri bitkisel etkin madde içerir. Bu bitki özü nedeniyle Prospan® öksürük pastilleri ile hafif bulanıklık ve düşük tat değişikliği meydana gelebilir. Ancak bunun ürün kalitesi üzerinde etkisi yoktur.

