

## Kullanma talimatı: Kullanıcı için bilgiler

### Prospar® öksürük damlası

#### Oral sıvı

Etkin madde: Kurutulmuş heder helix folium ekstresi

Bu kullanma talimatının tamamını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. Bu ilaç reçetesiz temin edilebilir. En iyi tedavi sonucunu elde etmek için Prospar® öksürük damlası doğru şekilde uygulanmalıdır.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Belirtilerinizin kötüleşmesi veya 7 gün sonra bir iyileşme görülmesi halinde mutlaka bir doktora başvurmalsınız.
- Belirtilen yan etkilerden birinin sizi önemli derecede etkilemesi veya bu broşürde belirtilmeyen bir yan etki fark etmeniz durumunda lütfen en kısa sürede doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz.

## Kullanma talimatının içeriği:

- Prospar® öksürük damlası nedir ve ne için kullanılır?
- Prospar® öksürük damlasını kullanmadan önce nelere dikkat edilmelidir?
- Prospar® öksürük damlası nasıl alınır?
- Olası yan etkiler nelerdir?
- Prospar® öksürük damlası nasıl saklanır?
- Diğer bilgiler

### 1. Prospar® öksürük sıvısı nedir ve ne için kullanılır?

Prospar® öksürük damlası, solunum yollarının kataral hastalıkları için bitkisel bir ilaçtır.

Prospar® öksürük damlası, öksürüğün eşlik ettiği akut solunum yolu enflamasyonu ve kronik enflamatuvar bronşiyal hastalıkların semptomatik tedavisine yardımcı olarak kullanılır.

#### Not:

Şikayetlerin devam etmesi ya da nefes darlığı, ateş, cerahatli ya da kanlı balgam görülmesi durumunda derhal bir doktora danışılmalıdır.

### 2. Prospar® öksürük damlasını kullanmadan önce nelere dikkat edilmelidir?

Prospar® öksürük damlası aşağıdaki durumlarda alınamaz

- Etkin maddeye veya ilacın diğer bileşenlerine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.
- Minimum alkol miktarlarının alınması (ör. bir bağımlılık tedavisi sonrasında) hekim tarafından yasaklanmışsa.

1 yaş altındaki çocuklar Prospar® öksürük damlasını kullanmamalıdır.

Prospar® öksürük damlası aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanılmalıdır:

Prospar® öksürük damlasının diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:

Herhangi bir inceleme yapılmamıştır. Şimdiye kadar hiçbir etki-leşim bilinmemektedir. Reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilaç kullanıyorsanız ya da kısa bir süre önce kullandıysanız doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz.

#### Gebelik ve emzirme dönemi:

Yeterli incelemeler yapılmadığı için bu ilaç gebelikte ve emzirme döneminde sadece hekim ile görüşükten sonra kullanılmalıdır.

#### Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler:

Özel önlemler gerekli değildir.

#### Prospar® öksürük damlasının içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler:

Bu ilaç sorbitol içerir. Her kullanımda 1,9 g'a varan sorbitol alınır. Belli şekere karşı toleranssızlık şikayetiniz olduğuna biliyorsanız lütfen Prospar® öksürük şurubunu almadan önce doktorunuza danışınız.

### 3. Prospar® öksürük damlası nasıl alınır?

Prospar® öksürük damlasını her zaman bu kullanma talimatına göre alınız. Tam emin olmadığınızda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Doktor tarafından aksi belirtilmediği müddetçe normal doz:

Yaş	Tek doz	Günlük toplam doz
Yetişkinler ve 10 yaş ve üstü ergenler	24 damla eşittir 16,8 mg kurutulmuş heder helix folium ekstresi	72 damla (3 defa 24 damla) eşittir 50,4 mg kurutulmuş heder helix folium ekstresi
Çocuklar (4-10 yaş)	16 damla eşittir 11,2 mg kurutulmuş heder helix folium ekstresi	48 damla (3 defa 16 damla) eşittir 33,6 mg kurutulmuş heder helix folium ekstresi
Çocuklar (1-4 yaş)	12 damla eşittir 8,4 mg kurutulmuş heder helix folium ekstresi	36 damla (3 defa 12 damla) eşittir 25,2 mg kurutulmuş heder helix folium ekstresi

#### Uygulama şekli:

Sabah, öğle ve akşam öğünlerden önce alınız.

#### Uygulama süresi:

Tedavinin süresi, klinik tablonun tipine ve şiddetine göre değişir; daha hafif solunum yolları enflamasyonlarında en az 1 hafta sürdürülmelidir.

Sürdürülebilir bir tedavi başarısı için belirtilerin azalmasından sonra bile ilacın 2-3 gün daha devam etmesi önerilir.

Prospar® öksürük damlasının etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna kanaat getirirseniz doktorunuzla veya eczacınızla görüşünüz.

#### Kullanmanız gerekenden daha fazla Prospar® öksürük damlası kullandıysanız:

Prospar® öksürük damlası günlük olarak dozaj talimatında belirtilen veya doktor tarafından reçete edilenden daha fazla alınmamalıdır. Aşırı miktarda (günlük dozun üç katından fazla) alındığında mide bulantısı, kusma ve ishale neden olabilir. Bu durumda doktorunuza danışmalısınız.

#### Prospar® öksürük damlasını kullanmayı unutursanız:

Bir sonraki seferde çift doz almayınız, doktor tarafından reçete edildiği veya kullanma talimatında tarif edildiği şekilde kullanmaya devam edin.

#### 4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Prospan® öksürük damlasının içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin değerlendirilmesinde şu yaygınlık bilgileri temel alınmaktadır:

<b>Çok yaygın:</b>	10 kişiden 1'ini etkileyebilen
<b>Yaygın:</b>	100 kişiden 1 ila 10'unu etkileyebilen
<b>Yaygın olmayan:</b>	1.000 kişiden 1 ila 10'unu etkileyebilen
<b>Seyrek:</b>	10.000 kişiden 1 ila 10'unu etkileyebilen
<b>Çok seyrek:</b>	10.000 kişiden 1'inden azını etkileyebilen
<b>Bilinmiyor:</b>	Mevcut verilerle yaygınlığı tahmin edilemiyor

##### **Olası yan etkiler:**

Sarmaşık içeren ilaçlar alındıktan sonra nadiren nefes darlığı, şişme, cilt kızarıklıkları, kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir. Hassas kişilerde çok seyrek mide bulantısı, kusma, ishal gibi mide bağırsak şikayetleri görülebilir.

##### **Yan etkilerin bildirilmesi**

Eğer yan etkiler fark ederseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bu husus, bu prospektüste belirtilmeyen yan etkiler için de geçerlidir.

Yan etkileri doğrudan Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, 53175 Bonn adresinde bulunan Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Federal İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü), Pharmakovigilanz (farmakovijilans) bölümüne de bildirebilirsiniz, web sitesi: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de).

Yan etkileri bildirerek bu ilacın güvenliğiyle ilgili daha fazla bilgi elde edilmesine katkı sağlamış olursunuz.

#### 5. Prospan® öksürük damlası nasıl saklanır?

##### **İlacı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız!**

İlacı kutusu ve kabının (etiket) üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmamalısınız! Son kullanma tarihi ayın son gününe denk gelir.

##### **Açıldıktan veya hazırlandıktan sonra kullanım ömrü:**

6 ay

#### 6. Diğer bilgiler

##### **Prospan® öksürük damlası neler içerir?**

Etkin maddesi: kurutulmuş heder helix folium ekstresi 100 ml sıvı 2 g kurutulmuş heder helix folium ekstresi içerir (5 - 7,5 : 1).  
Özütleme: Etanol %30 (m/m). 1 ml sıvı 29 damlaya eşittir. Yardımcı maddeler şunlardır: Sakkarin sodyum, anason yağı, acı rezene yağı, nane yağı, etanol %96, arıtılmış su.

##### **Prospan® öksürük damlasının görünümü ve paket içeriği:**

Prospan® öksürük damlası orijinal ambalajlarında 20 ml (N 1) ve 50 ml (N 2) sıvı olarak temin edilebilir.

##### **Ruhsat sahibi ve üretici:**

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden  
Tel.: 06101 / 539 – 300  
Faks: 06101 / 539 – 315  
İnternet: <http://www.engelhard-am.de>  
E-posta: [info@engelhard-am.de](mailto:info@engelhard-am.de)

**Bu kullanma talimatı Ekim 2018 tarihinde onaylanmıştır.**

##### **Notlar:**

Prospan® öksürük damlası bitkisel etkin madde içerir. Bu bitki özü nedeniyle sıvının içinde koyu asılı parçacıklar oluşabilir; ayrıca tat biraz değişebilir. Ancak bunun ürün kalitesi üzerinde etkisi yoktur.



**ENGELHARD**  
Arzneimittel